

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР

29.09.2021 (СРЕДА), 13:00

В ФОРМАТЕ ОН-ЛАЙН

Пациент с мультифокальным атеросклерозом и клинически значимым поражением всех сосудистых бассейнов.

Диагноз: распространенный атеросклероз с поражением аорты, аортального клапана, коронарных, сонных артерий и артерий нижних конечностей. Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени (достигнуты целевые значения), риск ССО 4.

ИБС: стенокардия напряжения II ФК. ЧКВ со стентированием ПКА (стент Promus Premier 3.00x24 мм) от 23.08.2021г. Нарушения проводимости сердца: полная блокада ПНПГ, блокада ПВЛНПГ, АВ-блокада 1 степени, СА-блокада 1 степени. Имплантация двухкамерного ЭКС BS Essentio DR 791166 от 16.08.2021г. Стеноз устья аорты тяжелой степени, недостаточность аортального клапана 1-2 ст. Операция TAVR биопротезом Portico 29 мм от 03.09.2021г. Хроническая сердечная недостаточность 2 ст., II-III ФК по NYHA. ИБМ: Ишемический инсульт в левой гемисфере в 2007г. Стентирование левой ВСА (Carotid Wallstent 9x40мм) от 26.08.2021г. Малая аневризма интраартерияльного отдела брюшной аорты. Перемежающаяся хромота II б ст. Сахарный диабет 2 типа. Хроническая болезнь почек 2 ст. (СКФ по Кокрофт-Голт 60мл/мин). Хроническая обструктивная болезнь легких. Хронический бронхит курильщика. Язвенная болезнь желудка, стадия ремиссии.

Докладчик: Землянская Оксана Александровна, к.м.н., н.с. отдела клинических проблем атеротромбоза

Вопросы для обсуждения:

- Как быть с ПХ и стенозами в артериях нижних конечностей? Вмешиваться в ближайшее время или ждать?
- Как быть с аневризмой брюшного отдела аорты?
- Выбор между симультанными операциями и этапными вмешательствами в коронарном и каротидном бассейне
- Как «притормозить» атеротромботический процесс помимо присоединения к аспирину сосудистой дозы ривароксабана? Нужно ли усилить терапию? Колхицин? Можно ли ждать эффекта от ингибиторов PCSK9 при достижении целевых значений ХСЛПНП?