

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР

20.10.2021 (СРЕДА), 13:00

В ФОРМАТЕ ОН-ЛАЙН

Пациентка 49 лет с атеросклерозом, диссекцией и тромбозом коронарных артерий, хроническим миелопролиферативным заболеванием.

Диагноз: Ишемическая болезнь сердца: атеросклероз коронарных артерий, атипичная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз (инфаркт миокарда передней локализации от 29.12.2017 года). Ангиопластика с бифуркационным стентированием ствола левой коронарной артерии с переходом на проксимальный и средний сегменты передней нисходящей артерии и проксимальный сегмент огибающей артерии стентами Калипсо 3,5x23 мм, 3,5x23 мм, 3,5x18 мм соответственно от 29.12.2017 года. Тромбоз ствола левой коронарной артерии и огибающей артерии от 29.12.2017 года. Краевая хроническая неокклюзирующая диссекция среднего сегмента передней нисходящей артерии от 30.07.18 года. Ангиопластика со стентированием среднего сегмента передней нисходящей артерии стентом Promus Premier 3,0x28 мм от 30.07.18 года. Окклюзирующая диссекция дистального сегмента передней нисходящей артерии с признаками внутрикоронарного тромбоза от 30.07.18 года. Ангиопластика со стентированием дистального сегмента передней нисходящей артерии стентом Promus Element 2,5x24 мм от 30.07.18 года. Ангиопластика с бифуркационным стентированием ствола левой коронарной артерии с переходом на проксимальный сегмент огибающей артерии и проксимальный сегмент передней нисходящей артерии стентами Promus Premier 4.0x20 мм и Promus Element 4.0x28 мм от 06.08.18 года. Гипертоническая болезнь 3 стадии. Артериальная гипертония 1 степени. Риск сердечно-сосудистых

осложнений 4 (очень высокий). Атеросклероз аорты, экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий. Гиперлипидемия ПА. Хроническое миелопролиферативное заболевание, JAK2 позитивное. Поверхностный гастрит, вне обострения.

Докладчик: Прус Юлия Андреевна, к.м.н., м.н.с. лаборатории фенотипов атеросклероза отдела проблем атеросклероза НИИ КК им.А.Л.Мясникова.

Вопросы для обсуждения:

- Рассматривается ли в данном случае диссекция как спонтанная?
- Рассматривается ли диссекция и тромбоз как осложнение хронического миелопролиферативного заболевания?
- Обоснованно ли назначение ингибиторов IIb/IIIa в данном случае?
- Обоснованно ли назначение ПОАК в данном случае?
- Какая антитромбоцитарная терапия показана пациентке в отдаленном периоде?