

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ



### Тактика лечения пневмонии при инфекции COVID-19



#### Показания для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии взрослых пациентов

НАЧАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И  
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ  
ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:

**ДОСТАТОЧНО  
ОДНОГО ИЗ  
КРИТЕРИЕВ**

**дисфункция  
центральной  
нервной системы**

(оценка по шкале  
комы Глазго менее 15  
баллов)

**артериальное давление  
АД сист. < 90 мм рт. ст.**

**нарастающая  
и выраженная одышка**

**печеночная  
дисфункция**  
(увеличение содержания  
билирубина выше 20  
мкмоль/л в течение 2-х  
дней или повышение  
уровня трансаминаз в  
два раза и более от  
нормы)

**ЧД > 30 в минуту**

**SpO2 < 90%**

**цианоз**

**коагулопатия**  
(число тромбоцитов  
< 100 тыс/мкл или их  
снижение на 50% от  
наивысшего  
значения в течение  
3-х дней)

**шок**  
(мраморность  
конечностей, акроцианоз,  
холодные конечности,  
симптом замедленного  
сосудистого пятна (>3 сек),  
лактат более 3 ммоль/л)

**острая почечная  
недостаточность**  
(мочеотделение < 0,5 мл/  
кг/ч в течение 1  
часа или повышение  
уровня креатинина в два  
раза от  
нормального значения)

