

[логотип SMFH*]	МЕДИКАМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ COVID-19			
ЛОПИНАВИР/ РИТОНАВИР /таблетки/	ИНТЕРФЕРОН бета-1b /инъекции/	РЕМДЕСИВИР /инфузии/ Развести в: 100-250 мл физраствора Стабильность: <ul style="list-style-type: none"> 4 ч. при комнатной температуре 24 ч. в холодильнике 	ГИДРОКСИХЛОРОХИН /таблетки/	ТОЦИЛИЗУМАБ /инфузии/ Развести в: 100 мл ф. р. Стабильность: <ul style="list-style-type: none"> 4 ч. при комнатной температуре 24 ч. в холодильнике
<ul style="list-style-type: none"> 2 таблетки по 200 мг/50 мг каждые 12 часов (ПЕРОРАЛЬНО) Суспензия: 5 мл/12 ч. 	<ul style="list-style-type: none"> 250 мкг (1 ампула)/48 ч. (п/к) 	<ul style="list-style-type: none"> Доза: 200 мг (в/в) в 1-й день Поддерживающая доза: 100 мг/24 ч (со 2-го по 10-й день) 	<ul style="list-style-type: none"> Доза: 400 мг/12 ч. в 1-й день Поддерживающая доза: 200 мг/12 ч (со 2-го по 14-й день) 	<ul style="list-style-type: none"> 8 мг/кг (в/в) (макс. 800 мг) Определить необходимость повторного введения через 12 ч.
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 14 дней	МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 14 дней	МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 10 дней	МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 14 дней	МАКСИМУМ 3 РАЗА
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: <ul style="list-style-type: none"> НЕ ИЗМЕЛЬЧАТЬ Являются ингибиторами СУР3А4 П. э. со стороны ЖКТ Не применять при тяжелой печеночной недостаточности↓ Фосампренавир/Ритонавир	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: <ul style="list-style-type: none"> Псевдогриппозный синдром Не применять при тяжелых психических заболеваниях/ депрессиях 	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: <ul style="list-style-type: none"> После процедуры очистить инфузионную линию с помощью 30 мл ф. р. Вводить в течение 30-60 мин. Отслеживать возможную инфузионную гипотонию ! Приостановить прием лопинавира/ритонавира и интерферона бета	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: <ul style="list-style-type: none"> Отслеживать уровень сахара в крови 	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: <ul style="list-style-type: none"> Вводить в течение 1 ч.
п/к: подкожно; в/в: внутривенно; ф. р.: физраствор 0,9%; п. э.: побочные эффекты smfh_2020 @smfamhosp_smfh				

*Мадридское общество больничных фармацевтов (Sociedad Madrileña de Farmacéuticos de Hospital)